

Flosul

SÍLA KAPALNÉ SÍRY

- ▶ Kapalná formulace
- ▶ Kontaktní a preventivní účinek
- ▶ Vedlejší akaricidní účinek
- ▶ Možné použití v ekologickém zemědělství

využijte výhodný balíček s mědnatým přípravkem Airone: 20 l Flosul + 20 l Airone

Detaily produktu

Účinná látka
síra 800 g/l

Formulace
suspenzní koncentrát (SC)

Přípravek je povolený k použití pouze profesionálními uživateli.

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně révy, jableň, obilovin, cukrovky, jahodníku a zeleniny proti padlí. FLOSUL je kapalným sírným fungicidem s kontaktním a preventivním účinkem, zejména proti houbovým patogenům ze skupiny pravých padlí. Přípravek vykazuje vedlejší akaricidní účinnost proti svluškám, hálčivcům a vlnovníkům. Kapalná formulace obsahuje smáčedla, která zajišťují dokonalé pokrytí povrchu ošetřovaných rostlin a tím i zvýšení účinku a efektivnějšího využití obsažené elementární síry.



Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	OL (dny)	Poznámka
réva	padlí révové	4 l/ha	5	od: 15 BBCH
rajče	padlí rajčatové	2 l/ha	3	od: 10 BBCH, do: 89 BBCH
růže	padlí růžové	3 l/ha	-	Od: 10 BBCH, do: 89 BBCH
oves, pšenice, ječmen, žito	padlí travní	10 l/ha	35	od: 10 BBCH, do: 69 BBCH
broskvoň	padlí broskvoňové	5 l/ha	3	od: 69 BBCH
jabloň	padlí jabloňové	7,5 l/ha	3	od: 60 BBCH
cukrovka	padlí řepné	7,5 l/ha	3	od: 10 BBCH, do: 89 BBCH
cuketa	padlí cukety	7,5 l/ha	3	od: 10 BBCH, do: 89 BBCH
okurka, tykvovité-jedlá slupka	padlí okurky	7,5 l/ha	3	od: 10 BBCH, do: 89 BBCH
tykev, tykvovité – nejedlá slupka	padlí okurky	5 l/ha	3	od: 10 BBCH, do: 89 BBCH
meloun cukrový, meloun vodní	padlí	7,5 l/ha	3	od: 10 BBCH, do: 89 BBCH
paprika	padlí	5 l/ha	3	od: 10 BBCH, do: 89 BBCH
jahodník	padlí jahodníkové	7,5 l/ha	3	od: 60 BBCH

Doporučení pro aplikaci:

Réva:

- nemá negativní účinek na dravého roztoče Typhlodromus pyri
- ošetření proti roztočům provádějte při rašení
- první ošetření proti padlí při délce letorostů 20 cm a dále dle infekčního tlaku
- před květem (BBCH 15-61): 2 l/ha / 300-500 l vody
- květ-sklizeň (BBCH 61-89): 2-4 l/ha / 500-1000 l vody
- doporučené kombinace:
 - před květem: Flosul 2 l/ha + Airone 1,25 l/ha
 - květ-sklizeň: Flosul 2-4 l/ha + Airone 2-2,5 l/ha
- pro posílení účinku na padlí je možné kombinovat s ostatními fungicidy

Jabloň:

- nemá negativní účinek na dravého roztoče Typhlodromus pyri
- aplikaci provádějte do 25°C – při vyšších teplotách riziko fytotoxicity
- na citlivých odrůdách jaderovin může ošetření způsobit rzivost slupky plodů.
- před květem: dávka 7 l/ha (koncentrace 0,7%)
- po kvetení: 4 l/ha (koncentrace 0,4%)