

# Kunshi®

## NADČASOVÉ ŘEŠENÍ PRO PRVNÍ APLIKACE

- ▶ 2 Účinné látky - systémová i kontaktní = > jistota dvojího způsobu účinku
  - Cymoxanil (systém)- preventivní i kurativní účinek, STOP EFEKT (zastaví rozvoj patogena)
  - Fluazinam (kontakt) – protektivní účinek
- ▶ Výborný účinek proti plísni bramboru
- ▶ Významný vedlejší účinek na další choroby brambor :  
Sclerotinia ssp., Alternaria ssp., Botrytis cinerea
- ▶ Alternativa pro náhradu produktů s mancozebem
- ▶ Vhodný pro jakoukoliv variantu v termínu ošetření během růstu brambor
- ▶ Výborné reference z vyspělých bramborářských zemí (BENELUX, Anglie)

### Detaily produktu

#### Účinná látka

**250 g/kg cymoxanil + 375 g/kg fluazinam**

#### Formulace

**vodorozpustné granule (WG)**

Přípravek KUNSHI obsahuje účinné látky fluazinam a cymoxanil.

Fluazinam je kontaktní fungicid s protektivní účinností. Zabraňuje klíčení spór a růstu mycelia.

Cymoxanil je foliární fungicid s protektivní a kurativní účinností. Působení cymoxanilu je kontaktní a lokálně systémové (translaminární).

Zabraňuje klíčení spór a růstu mycelia.





Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	Dávka vody	OL
brambor	plíseň bramborová	0,4 - 0,5 kg/ha	200-500 l/ha	7

Ošetřuje se preventivně nebo při zjištění prvních příznaků choroby.

Optimální dávka se volí podle síly infekčního tlaku a na základě signalizace.

V průběhu sezony se ošetřuje maximálně 8 x v intervalu 7-10 dní, při silném infekčním tlaku se interval zkrátí na 7 dní.

#### Doporučení pro aplikaci :

- ▶ v rámci postřikového programu aplikujte na začátku– ideálně první 3 postřiky
- ▶ přípravek nejdříve do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou důkladně rozmíchejte a doplňte vodou na stanovený objem
- ▶ od 3. postřiku přidávejte do TM přípravek NARITA k pojištění účinnosti vůči listovým skvrnitostem brambor (*Alternaria* spp.)- zejména u citlivých odrůd a v případě stresových faktorů během vegetace – střídání vysokých a nízkých teplot, period sucha a vlhka atd.

**2** účinné látky = jistota dvojího účinku

**Kunshi<sup>®</sup>** 0,5 kg/ha

125 g/ha **CYMOXANIL**

• Kurativní působení

Výborný partner pro složité situace

+

**FLUAZINAM** 188 g/ha

Preventivní účinek P. infestans Významný vedlejší účinek

Multifunkční fungicid (FRAC) na *Sclerotinia* spp.

Ochrana hlíz

Alternativa k mancozebu

• 0,25 kg/ha Cymbal (112,5 g ú.l./ha)

• 0,3 L/ha standardní přípravek (150 g ú.l./ha)

**Kunshi<sup>®</sup>**

