

# Protendo<sup>®</sup>

300 EC



## TROCHU JINÝ AZOL

- ▶ Vysoce systémový účinek
- ▶ Preventivní a kurativní účinek
- ▶ Jeden z neúčinnějších azolů na trhu
- ▶ Pohybuje se translaminárně a akropetálně (ochrana nových přírůstků)
- ▶ Dlouhodobá účinnost
- ▶ Bez omezení v OP podzemní a povrchové vody

### Detaily produktu

#### Účinná látka

**prothiokonazol 300 g/l**

#### Formulace

**emulgovatelný koncentrát (EC)**

Protendo 300 EC obsahuje účinnou látku prothiokonazol patřící do skupiny DMI avšak oproti většině těchto látek však nepatří do podskupiny triazolů, ale jako jediný do podskupiny triazolinthiones. A právě oproti dosavadním triazolovým fungicidům zasahuje řetězec biosyntézy ergosterolu na více místech, což zvyšuje jistotu účinnosti a je tak jedním z neúčinnějších azolů na trhu. Je vysoce systémový a v rostlině se pohybuje se translaminárně a akropetálně, což zajišťuje ochranu nových přírůstků.



Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	OL	Poznámka
pšenice	braničnatka plevová, braničnatka pšeničná, padlí travní, rez pšeničná, rez plevová, helmintosporióza obilnin, fuzariózy klasu	0,65 l/ha	AT	od 25 BBCH, do 61 BBCH
ječmen	rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, padlí travní, rynchosporiová skvrnitost ječmene	0,65 l/ha	AT	od 25 BBCH, do 61 BBCH
žito ozimé	rez pšeničná, padlí travní, rynchosporiová skvrnitost	0,65 l/ha	AT	od 25 BBCH, do 61 BBCH
triticale	braničnatka pšeničná, padlí travní, rynchosporiová skvrnitost, braničnatka plevová, rez plevová	0,65 l/ha	AT	od 25 BBCH, do 61 BBCH
řepka olejka	hlízenka obecná	0,6 l/ha	AT	od 61 BBCH, do 69 BBCH
řepka olejka ozimá	fomové černání stonků řepky	0,6 l/ha	AT	od: 16 BBCH, do: 59 BBCH

Max. počet aplikací v plodině 2x. Interval mezi aplikacemi 14 dnů pro obiloviny, 21 dní pro řepku.

Název plevele	Protendo
stéblolam	
septoriová skvrnitost	
braničnatka	
padlí	
rez plevová	
rez pšeničná	
DTR (helmintosporióza) Pyrenophoratrítica	
Fusarium	
Rhynchosporiová skvrnitost	
Ramuláriová skvrnitost	
Hnědá skvrnitost ječmene	

> 95 % > 85-95 % > 75-85 % > 65-75 % < 65 %

### Doporučení pro aplikaci :

- z důvodu rozšíření spektra účinnosti neaplikujte přípravek Protendo samostatně, ale vždy v kombinaci s dalším přípravkem
- použití obiloviny aplikace T2:
  - Protendo 0,4 l + Conclude 0,5 l/ha
  - Protendo 0,4 l + Avella 0,6 l/ha
- použití pro aplikační termín T3:
  - Protendo 0,4 l + Sirena 0,5 l/ha
  - Protendo 0,4 l + Molina 0,5-0,6 l/ha
  - Protendo 0,4 l + Teson 0,5 l/ha